

# Profilassi della malaria 2017

Raccomandazioni del "Comitato di esperti per la medicina di viaggio" (CEMV / Svizzera).

- 1.) E' raccomandato proteggersi dalle punture di zanzare in tutte le zone endemiche, comprese le zone dove il rischio di trasmissione della malaria è giudicato minimo\*.
- 2.) La profilassi medicamentosa e/o la terapia di soccorso sono prescritte a dipendenza delle destinazioni\*.

\* Una lista dettagliata dei paesi è regolarmente pubblicata nel Bollettino dell'Ufficio federale della sanità pubblica UFSP (documento: Santé-voyages: Vaccinations et mesures antipaludiques [<http://www.bag.admin.ch>]).

P	Atovaquone/proguanil <b>APP</b> , meflochina <b>MP</b> o doxiciclina <b>DP</b> come profilassi medicamentosa
Ps (T)	Profilassi medicamentosa (stagionale): atovaquone/proguanil <b>APP</b> , meflochina <b>MP</b> o doxiciclina <b>DP</b> Terapia di soccorso con artemether/lumefantrina <b>ALT</b> o atovaquone/proguanil <b>APT</b> per situazioni particolari (consultare la lista dell'UFSP*)
T	<b>Nessuna profilassi medicamentosa consigliata</b> artemether/lumefantrina <b>ALT</b> o atovaquone/proguanil <b>APT</b> come terapia di soccorso
(T)	<b>Nessuna profilassi medicamentosa consigliata</b> Terapia di soccorso con artemether/lumefantrina <b>ALT</b> o atovaquone/proguanil <b>APT</b> per situazioni particolari (consultare la lista dell'UFSP*)

